

Д-Р МИЛКА НАНОВА,
офис Плевен, НССЗ

Сред растителните храни у нас картофите заемат второ място след пшеницата. Картофите са широко разпространена култура, от която са създадени около 1000 сорта. Те предпочитат умерения климат. Високите температури се отразяват неблагоприятно върху растежа и развитието особено в периода на образуване на клубеничите. Високи изисквания към влажността в почвата и въздуха картофите имат особено през периода на бързо нарастване на листната маса и клубеничите. Най-подходящи почви са рохкавите, наносни и торфени. Картофите не обичат леки, силно песъчливи и много тежки глиниести заблатени и кисели почви.

Прави се дълбока оран на 25-30 см след зърнени, житни и бобови култури. Късно през есента се преорава или култивира на 12-15 см дълбочина, а напролет отново са обработвани на 15-18 см без да се обръща пластиъм.

1000 kg картофи извличат от почвата по 5 kg азот, 2 kg фосфор, 8 kg калий и 3 kg калций. На гектар трябва да се внесат азот и фосфор по 9-12 kg и калий - 16-18 kg. С азот се наторява

ЦАРЕТЕ НА ТРАПЕЗАТА

Картофите най-харесват рохкави и торфени почви

ОТ 15 април до 15 май се засаждат средно ранните сортове

при сейческата и преди едно от окопаванията.

Посадъчният материал трябва да е здрав от семенни участъци.

Средно ранните картофи се засаждат от 15 април до 15 май, късните - от 20 юни до 20 юли. Между редовете трябва да има 70 см, вътре в реда - 20-40 см. Клубеничите са поставяни на 6-10 см дълбочина. Сейческата норма е 200-350 kg на гектар.

Трябва да се грижите за растението по време на вегетацията. Окопават се гъва или три пъти - първо след поникването, а после



през 12-15 дни. При второто и третото окопаване се прави леко загърляне.

Картофите най-често страдат

от листни заболявания, обикновена мозайка, мана, черни листни петна, красма по клубеничите, черното краче и рак. Нападат

ги също колорадски бръмбар, картофен молец, картофена дървеничка, майски бръмбар, картофена нематога.